

ISSN 1305-5194



Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği



Cilt 29, Ek Sayı, Yıl 2015

Çocuk Cerrahisi dergisi

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ
PEDIATRİK ÜROLOJİ DERNEĞİ

KONGRE ÖZEL SAYISI

**Journal of the Turkish Association of Pediatric Surgeons and
The Society for Pediatric Urology in Turkey
Volume 29, Supplement, 2015**

LOGOS

PREMATÜRELERDE NADİR BİR AKUT BATIN SEBEBİ: INVAJINASYON

E Aydın

Bahçelievler Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Akut batin nedeni ile kliniğimize refere edilen ve invajinasyon saptanan yenidoğan döneminde ki olguyu sunmak.

Olgu: Prenatal herhangi bir problemi olmayan, 34. gestasyonel haftada normal spontan vajinal yol ile 2500gr olarak doğan erkek olgu 10 gün boyunca yoğun bakımda takip edilmiş. Bir gün entübe kalan olgunun takibinde sorunsuz seyretmesi üzerine taburcu edilmiş. Olgu taburcu edildikten bir hafta sonra dış merkezden tarafımıza batin distansiyonu, safralı kusma ve rektal kanama şikayeti ile refere edildi. Olgunun yapılan ilk muayenesinde barsak sesleri dört kadranda normoaktif, batin distandü idi. Sağ alt kadranda hassasiyeti mevcuttu ancak defans ve rebound yoktu. Parlak kırmızı renkte kanlı gaytası mevcuttu. Laboratuvarında beyaz küresinin 22000/mm³ olması dışında anormallik yoktu. Ayakta karın grafisinde diyafram altı serbest hava yoktu. Karın ultrasonunda sağ alt kadranda 2 cm'lik ileokolik invajinasyon saptandı. Olgu ngt drenajına alındı ve safralı gelenlerinin olduğu görüldü. Operasyon kararı verilen olguda eksplorasyonda ileokolik invajinasyon saptandı. Manuel redüksiyon yapılan olguda batin içi ek patoloji saptanmadı. Olgu post operatif 2. günde beslenmeye başlandı ve post operatif 8. günde full oral beslenir olarak taburcu edildi. Olgu 6 aylık süreçte sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Sonuç: Yenidoğan döneminde safralı kusma ve rektal kanama ile başvuran olgularda nekrotizan enterokolitin yanında invajinasyonda olabileceği unutulmamalıdır.

A RARE CAUSE OF ACUTE ABDOMEN IN PREMATURITY: INTUSSUSCEPTION

E Aydın

Bahçelievler State Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey

Aim: To present a neonatal referred to our clinic due to acute abdomen and diagnosed as intussusception.

Case: A newborn who didn't have any prenatal problem born at 34th gestational weeks with normal spontaneous vaginal way, weighed 2500gr was monitored in intensive care unit for 10 days. Except being intubated for one day he was well on follow up and discharged to home. One week after discharge he was referred to our clinic with bilious vomiting and rectal bleeding. At physical examination he had normoactive bowel sounds and abdominal distension with tenderness on the right lower quadrant without defense or rebounds. White blood cell count was 22000/mm³ besides other values were normal. There was no free air under the diaphragm at abdominal radiography but abdominal ultrasound revealed 2cm ileocolic intussusception in the right lower quadrant. Operation decision were taken and ileocolic intussusception was revealed. Manuel reduction was performed and no more pathology was found. He was fed 2 days after operation and discharged 8 days after. He was free of any symptom for the last 6 months.

Conclusion: Intussusception should be remembered in neonatal admitted with bilious vomiting and rectal bleeding besides necrotizing enterocolitis.

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi


19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

28-31 Ekim 2015, Antalya

Sayın Emrah AYDIN

***28-31 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen
33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi &
19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi'ne katılmıştır.***

Ayşe İSLAMOĞLU
Çocuk Cerrahisi Hemşireleri
Derneği Başkanı



Prof. Dr. Gonca Topuzlu TEKANT
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Başkanı

